

치주 질환

치주 질환은 성인이 되었을 때 치아 상실의 주된 요인입니다.

초기와 중기 단계의 치주 질환은 증상이 거의 없습니다. 그러나 **치주 질환이 점점 진행되면서** 잇몸이 충혈되거나, 부어 오르기 또는 출혈이 일어나며, 지속적으로 입냄새가 나고, 치아가 흔들리거나 치아 사이가 벌어지며, 음식을 씹을 때 치아 교합 상태가 변하는 증상들이 나타납니다.

치주염은 다음과 같이 여러 단계 및 형성 과정을 거칩니다.

치은염

플라크 축적으로 인한 가벼운 잇몸 감염



탐침으로 검사할 때, 잇몸이 충혈되거나 통증이나 피가 나옵니다.

치주염

치료하지 않고 방치하면 잇몸이 감염되어 뼈와 뼈를 지지하는 조직들이 손상될 수 있습니다.

잇몸이 치아로부터 분리됩니다.



뼈의 밀도가 감소합니다.

진전된 치주염

이 단계에서 잇몸이 더욱 소실되어 치아로부터 분리됩니다.



고름이 생길 수 있습니다.

뼈가 계속 약해집니다.

이가 흔들리거나 빠질 수 있습니다.

치주 질환의 검사

치과 의사는 정기 검진 시에 치주 질환이 있는지 검사합니다. **치주 탐침**을 사용하여 잇몸 조직이 치아에서 떨어진 곳이 있는지 또는 잇몸과 치아 사이에 **치낭**이 생겼는지 확인합니다.

자료 제공

Crest Oral-B®


P&G 프로페셔널 오럴 헬스

치주 질환의 치료와 예방


치주 질환의 유형과 증상의 진행 정도에 따라 치료 방법이 달라집니다. 치료 방법은 다음과 같습니다.



스케일링—잇몸선 위 아래에 쌓여 있는 퇴적물을 제거하여 치아를 청소합니다.



치근 평활—잇몸이 치유될 수 있도록 거친 치근 표면을 매끈하게 다듬어 줍니다.



구강 관주법—잇몸선 아래에 액체를 주입하여 세균을 죽이거나 씻어내어 건강한 조직이 다시 자라게 합니다.

깊은 치낭이 발견되고 치조골이 손상되었으면 치과 의사는 **치주 수술**을 권할 수도 있습니다.

치주 질환으로부터 치아를 보호하려면 플라크의 축적을 방지하는 것이 가장 중요합니다. 매일 이를 닦고 치실을 사용하는 것 외에 정기적으로 전문적인 구강 청소 치료를 받으십시오.

자료 제공

Crest Oral-B®

P&G 프로페셔널 오럴 헬스